

À surveiller : Avril est le dernier mois où une gelée reste possible dans l'Ouest, rarement après la mi-avril. Posez le voile sur les levées dès que la minimale annoncée passe sous 3 °C, et ramassez les limaces le soir pendant les averses douces.

Semer sous abri

Concombre	Chou de Bruxelles · 1re moitié
Cornichon	Chou kale
Courge butternut	Basilic
Courgette	Ciboulette · 1re moitié
Maïs doux · 2e moitié	Coriandre · 1re moitié
Melon · 1re moitié	Estragon · 1re moitié
Pastèque	Menthe
Pâtisson	Origan · 1re moitié
Potimarron	Romarin
Potiron	Sauge · 1re moitié
Tomate · 1re moitié	Thym
Tomate cerise · 1re moitié	Bourrache · 1re moitié
Céleri branche · 1re moitié	Capucine
Fenouil	Œillet d'Inde · 1re moitié
Scarole et chicorée frisée · 2e moitié	Tournesol

Semer en place

Pois à écosser	Chou de Bruxelles
Pois mange-tout	Chou pommé
Betterave	Chou-fleur
Carotte	Chou-rave
Navet	Aneth
Panais	Cerfeuil
Radis	Ciboulette
Oignon · 1re moitié	Coriandre
Poireau	Menthe · 2e moitié
Batavia	Persil
Blette	Bourrache
Céleri branche · 2e moitié	Capucine · 2e moitié
Épinard	Œillet d'Inde · 2e moitié
Laitue	Souci
Roquette	Tournesol · 2e moitié
Brocoli	

Planter, repiquer

Pomme de terre	Asperge · 1re moitié
Topinambour · 1re moitié	Ciboulette
Oignon · 1re moitié	Estragon
Poireau · 2e moitié	Menthe
Batavia	Origan · 2e moitié
Blette · 2e moitié	Persil
Céleri branche · 2e moitié	Romarin
Laitue	Sauge
Brocoli	Thym
Chou pommé	Fraisier
Chou-fleur	Bourrache · 2e moitié
Chou-rave	Œillet d'Inde · 2e moitié
Artichaut	Souci

Récolter

Navet · 2e moitié	Rhubarbe · 2e moitié
Radis	Cerfeuil · 2e moitié
Batavia · 2e moitié	Ciboulette
Épinard	Menthe · 2e moitié
Laitue	Romarin
Roquette · 2e moitié	Sauge
Chou-fleur	Thym
Asperge	

Les gestes de avril

- ☐ Buttez les pommes de terre plantées en mars dès que les tiges atteignent 15 cm : ramenez la terre de chaque côté du rang à la houe, pour que les tubercules ne verdissent pas à la lumière.
- ☐ Tendez sur arceaux un filet à maille de 0,8 mm au-dessus des carottes semées en mars et lestez tout le pourtour : la mouche de la carotte pond en avril-mai, et le filet doit être posé avant la ponte.
- ☐ Éclaircissez radis à 3 cm et laitues à 25 cm, de préférence le soir, puis arrosez : une plantule gênée par sa voisine file en feuilles et ne grossit pas.
- ☐ Enfoncez dès maintenant à 30 ou 40 cm de profondeur les tuteurs de 1,80 m prévus pour les tomates : placés avant la plantation du début mai, ils ne blessent pas les racines.
- ☐ Posez dès le 20 avril une toile de paillage biodégradable ou un feutre sous les fraisiers : la paille convient mieux en région sèche, alors que dans l'Ouest humide la toile garde les fruits propres.
- ☐ Coupez les hampes florales des fraisiers remontants plantés en mars, dans les 4 semaines qui suivent leur plantation : ils consacrent leur énergie à l'enracinement plutôt qu'à des fruits trop précoces.
- ☐ Aménagez un coin de 1 m² au fond du jardin avec bûches, pierres et feuilles : hérissons, crapauds et carabes y logent et mangent les limaces que vous ne ramasserez jamais toutes.
- ☐ Semez courgettes, concombres et potirons en godets sous abri vers le 5 avril, 2 graines par godet en gardant la plus vigoureuse : plantés fin mai, ils craignent un repotage tardif.