

À surveiller : Les gelées sont rares, mais un vent froid peut stopper les jeunes plants. Installez paillage et goutte-à-goutte avant mai : en avril, l'eau n'est pas encore un souci, en mai elle le devient très vite.

Semer sous abri

Concombre	Potimarron
Cornichon	Potiron
Courge butternut	Basilic · 1re moitié
Courgette · 1re moitié	Menthe · 1re moitié
Maïs doux · 1re moitié	Romarin · 1re moitié
Pastèque · 1re moitié	Sauge · 1re moitié
Pâtisson	Thym · 1re moitié

Semer en place

Concombre · 2e moitié	Épinard
Cornichon · 2e moitié	Laitue
Courge butternut · 2e moitié	Roquette
Courgette	Chou de Bruxelles · 2e moitié
Maïs doux	Chou-rave
Melon · 2e moitié	Aneth
Pâtisson · 2e moitié	Basilic · 2e moitié
Potimarron · 2e moitié	Ciboulette
Potiron · 2e moitié	Coriandre
Haricot à rames · 2e moitié	Estragon
Haricot vert nain	Menthe
Betterave	Origan
Carotte	Persil
Navet	Thym
Panais	Bourrache
Radis	Capucine
Poireau	Œillet d'Inde
Batavia	Souci
Blette	Tournesol
Céleri branche	

Planter, repiquer

Aubergine · 2e moitié	Céleri branche
Concombre · 2e moitié	Laitue
Cornichon · 2e moitié	Chou-rave
Courge butternut · 2e moitié	Artichaut · 1re moitié
Courgette	Basilic · 2e moitié
Maïs doux	Ciboulette
Melon · 2e moitié	Estragon
Pastèque · 2e moitié	Menthe
Pâtisson · 2e moitié	Origan
Piment · 2e moitié	Persil
Poivron · 2e moitié	Romarin
Potimarron · 2e moitié	Sauge
Potiron · 2e moitié	Thym
Tomate	Fraisier · 1re moitié
Tomate cerise	Bourrache
Céleri-rave · 2e moitié	Capucine
Patate douce · 2e moitié	Œillet d'Inde
Pomme de terre · 1re moitié	Souci
Batavia	Tournesol
Blette	

Récolter

Fève	Rhubarbe
Pois à écosser · 2e moitié	Aneth · 2e moitié
Pois mange-tout · 2e moitié	Cerfeuil
Navet	Ciboulette
Radis	Coriandre · 2e moitié
Oignon · 2e moitié	Estragon
Batavia	Menthe
Épinard	Origan · 2e moitié
Laitue	Persil · 2e moitié
Roquette	Romarin
Chou kale · 1re moitié	Sauge
Chou pommé · 2e moitié	Thym
Chou-rave · 2e moitié	Fraisier
Artichaut	Souci
Asperge	

Les gestes de avril

- ☐ Plantez les tomates entre le 1er et le 15 avril, quand le sol atteint 12 °C : enterrez la tige jusqu'aux premières feuilles, un pied tous les 50 cm, rangs à 80 cm.
- ☐ Plantez le tuteur de 2 m en même temps que le plant, enfoncé de 30 à 40 cm : posé après coup, il blesse les racines, et le vent d'avril couche les tomates non soutenues.
- ☐ Paillez de 5 à 10 cm de paille le pied des tomates dès que le plant a repris, 15 jours après la plantation : dégagez 3 à 5 cm autour du collet, et l'été sec vous coûtera moins d'eau.
- ☐ Arrosez les tomates au pied, le matin, avec peu d'eau et souvent la première semaine, puis espacez en augmentant : visez 10 L/m² par semaine à partir de mai.
- ☐ Inspectez chaque semaine le dessous des feuilles de pommes de terre : le Sud est la région où le doryphore est le plus présent, et ses œufs orange sont groupés par paquets de 10 à 40 ; écrasez-les, ramassez larves et adultes.
- ☐ Buttez les pommes de terre plantées fin février quand leurs tiges mesurent 15 cm : la terre ramenée de chaque côté protège les tubercules de la lumière.
- ☐ Semez de la moutarde blanche (d'avril à octobre) sur une planche qui restera libre : fauchez 8 à 10 semaines plus tard, mais jamais avant ni après des choux, navets ou radis.
- ☐ Plantez aubergines et poivrons à partir du 20 avril, après 7 à 10 jours de durcissement : ils redoutent un sol froid et un coup de vent sec.