

À surveiller : Le mois le plus chaud de l'année reste modéré dans le Nord-Est, avec des nuits à 10 °C et des séries pluvieuses. C'est le scénario du mildiou : inspectez après chaque pluie plutôt qu'à date fixe, et arrosez peu.

Semer sous abri

Pak-choï · 1re moitié

Semer en place

Haricot vert nain · 1re moitié

Navet · 2e moitié

Radis

Radis noir · 1re moitié

Batavia

Laitue

Mâche · 2e moitié

Roquette

Scarole et chicorée frisée · 1re moitié

Chou-rave · 1re moitié

Pak-choï

Aneth · 1re moitié

Persil · 2e moitié

Bourrache · 1re moitié

Planter, repiquer

Batavia

Fenouil · 1re moitié

Laitue

Scarole et chicorée frisée

Brocoli · 1re moitié

Chou kale

Chou pommé · 1re moitié

Chou-fleur

Chou-rave

Pak-choï

Récolter

Concombre · 2e moitié

Cornichon · 2e moitié

Courgette

Fève

Haricot vert nain

Pois à écosser

Pois mange-tout

Betterave · 2e moitié

Carotte

Navet

Pomme de terre

Radis

Ail

Échalote · 2e moitié

Oignon · 2e moitié

Batavia

Blette · 2e moitié

Épinard · 1re moitié

Laitue

Roquette

Brocoli · 2e moitié

Chou pommé · 2e moitié

Chou-fleur

Chou-rave

Artichaut

Rhubarbe

Aneth

Basilic

Cerfeuil

Ciboulette

Coriandre

Estragon

Menthe

Origan

Persil

Romarin

Sauge

Thym

Cassissier

Fraisier

Framboisier

Groseillier

Myrtillier

Bourrache

Capucine

Œillet d'Inde

Souci

Les gestes de juillet

- ☐ Coupez au ras du sol les cannes de framboisiers non remontants qui ont fruité, dès la fin de la récolte vers la fin juillet, et gardez 6 à 10 cannes par mètre : elles fructifieront l'an prochain.
- ☐ Inspectez tomates et pommes de terre 2 fois par semaine après chaque épisode doux et pluvieux de 2 à 3 jours : le mildiou prospère en temps chaud et humide, et la première tache brune se retire à la main.
- ☐ Semez le radis noir avant le 15 juillet et les navets d'automne dès le 16 : la fraîcheur d'automne du Nord-Est leur convient, et les premiers navets se récoltent en octobre.
- ☐ Vidangez le fond de la cuve et rincez le filtre après 3 semaines sans pluie : le premier orage lessive les dépôts du toit, qui ne doivent pas finir sur vos légumes.
- ☐ Récoltez les graines d'œillets d'Inde et de capucines quand elles sont brunes et sèches, puis séchez-les 2 semaines à l'abri du soleil : elles se conservent en sachet de papier.
- ☐ Arrachez les premières pommes de terre précoces à la fin juillet, par temps sec, quand le feuillage jaunit : 90 jours après plantation, elles sont à leur calibre.
- ☐ Inspectez 2 fois par semaine le dessous des feuilles de choux, filet ou non : écrasez les paquets d'œufs jaunes et ramassez les chenilles de piéride avant qu'elles ne perforent les pommes.
- ☐ Cueillez les haricots verts tous les 2 à 3 jours, gousses encore fines : celles laissées à mûrir sur le plant arrêtent la floraison.