

À surveiller : Juillet peut atteindre 35 °C autour de Toulouse ou de Bordeaux alors qu'il fait 25 °C à Rennes : adaptez arrosage et ombrage à votre secteur. Surveillez aussi l'oïdium sur les courgettes et les concombres, favorisé par les nuits humides.

Semer sous abri

Pak-choï

Semer en place

Haricot à rames · 1re moitié	Laitue
Haricot vert nain	Roquette
Carotte · 1re moitié	Scarole et chicorée frisée
Navet · 2e moitié	Brocoli
Radis	Chou-rave
Radis noir	Pak-choï
Rutabaga · 1re moitié	Aneth
Batavia	Basilic · 1re moitié
Blette · 2e moitié	Bourrache
Fenouil · 1re moitié	

Planter, repiquer

Poireau	Chou kale
Batavia	Chou pommé
Fenouil · 1re moitié	Chou-fleur
Laitue	Chou-rave
Scarole et chicorée frisée	Pak-choï
Brocoli	Basilic · 1re moitié

Récolter

Concombre	Chou pommé
Cornichon	Chou-fleur
Courgette	Chou-rave
Pâtisson · 2e moitié	Artichaut
Poivron · 2e moitié	Rhubarbe
Tomate · 2e moitié	Aneth
Tomate cerise · 2e moitié	Basilic
Fève	Cerfeuil · 1re moitié
Haricot à rames · 2e moitié	Ciboulette
Haricot vert nain	Coriandre · 1re moitié
Pois à écosser	Estragon
Pois mange-tout	Menthe
Betterave	Origan
Carotte	Persil
Navet	Romarin
Pomme de terre	Sauge
Radis	Thym
Ail	Cassissier
Échalote	Fraisier
Oignon	Framboisier
Batavia	Groseillier
Blette	Myrtillier
Épinard · 1re moitié	Bourrache
Fenouil · 2e moitié	Capucine
Laitue	Œillet d'Inde
Roquette	Souci
Brocoli	Tournesol

Les gestes de juillet

- ☐ Préparez vos absences d'été : paillez de 5 à 10 cm, installez un goutte-à-goutte avec programmateur ou des oyas de 5 à 10 L (une par m² environ), et demandez à un voisin de récolter les courgettes tous les 2 jours.
- ☐ Coupez au ras du sol, après la dernière cueillette, toutes les cannes de framboisiers non remontants qui ont fructifié, et gardez les 6 à 10 plus vigoureuses par mètre : elles fructifieront l'an prochain.
- ☐ Coupez les stolons des fraisiers après la récolte, en gardant ceux de 4 à 5 pieds mères pour multiplier vos plants : ils seront replantés à partir de la mi-août.
- ☐ Semez les navets d'automne dès le 16 juillet, en lignes espacées de 25 cm, en sol frais : ils se récoltent d'octobre à décembre.
- ☐ Arrachez l'ail d'automne quand la moitié supérieure des feuilles est sèche, puis laissez-le sécher 5 à 7 jours à l'abri du soleil, dans un endroit sec et aéré.
- ☐ Fauchez ou arrachez les herbes avant qu'elles ne montent en graine, toutes les 2 semaines, et ne compostez pas celles qui ont grainé : leurs graines survivent dans le tas.
- ☐ Arrosez les groseilliers à 10 L par pied une fois par semaine en l'absence de pluie : ils craignent la sécheresse, alors que les cassissiers installés depuis plus d'un an s'en passent généralement.
- ☐ Récoltez les graines de coriandre quand elles sont brunes et sèches, puis faites-les sécher 2 semaines : elles se gardent en sachet de papier pour les semis de septembre.