

À surveiller : Les premières canicules arrivent en juin, 35 °C et mistral. Votre meilleure défense est l'arrosage profond, 10 à 15 L/m² une à deux fois par semaine, plutôt qu'un petit arrosage quotidien qui garde les racines en surface.

Semer sous abri

Fenouil · 2e moitié Chou kale
Scarole et chicorée frisée

Semer en place

Concombre · 1re moitié Brocoli
Cornichon · 1re moitié Chou de Bruxelles · 1re moitié
Courgette Chou kale · 2e moitié
Maïs doux Chou pommé
Pâtisson · 1re moitié Chou-fleur
Haricot à rames Aneth
Haricot vert nain Basilic
Rutabaga Persil · 1re moitié
Poireau · 1re moitié Bourrache
Scarole et chicorée frisée · 2e moitié Tournesol · 1re moitié

Planter, repiquer

Courgette · 1re moitié Chou-fleur · 2e moitié
Chou de Bruxelles · 2e moitié Basilic
Chou pommé · 2e moitié Persil · 1re moitié

Récolter

Concombre Chou-fleur
Cornichon Chou-rave
Courgette Artichaut
Pâtisson · 2e moitié Rhubarbe
Tomate · 2e moitié Aneth
Tomate cerise · 2e moitié Basilic
Fève · 1re moitié Ciboulette
Haricot à rames · 2e moitié Coriandre
Haricot vert nain Estragon
Pois à écosser · 1re moitié Menthe
Pois mange-tout · 1re moitié Origan
Betterave Persil
Carotte Romarin
Navet Sauge
Pomme de terre Thym
Radis · 1re moitié Cassissier · 2e moitié
Ail Fraisier
Échalote Framboisier
Oignon Groseillier
Batavia Myrtillier
Blette Bourrache
Épinard · 1re moitié Capucine
Laitue Œillet d'Inde
Roquette Souci
Brocoli Tournesol · 2e moitié
Chou pommé · 1re moitié

Les gestes de juin

- ☐ Tendez une toile d'ombrage à 30 % au-dessus des poivrons et aubergines, de midi à 17 h, quand 35 °C sont annoncés : les fleurs avortent au-delà de 32 à 35 °C.
- ☐ Arrosez tomates à 15 L/m² et courgettes à 20 L/m² par semaine, en deux apports avant 8 h du matin : l'eau profonde fait descendre les racines.
- ☐ Surveillez 2 fois par semaine le feutrage blanc sur courgettes et concombres : l'oïdium se développe avec un feuillage serré ou un excès d'azote ; retirez les feuilles atteintes et espacez les pieds.
- ☐ Récoltez l'ail et les échalotes quand la moitié supérieure des feuilles est sèche, puis laissez-les sécher à l'ombre, dans un endroit sec, quelques jours à 2 semaines.
- ☐ Semez les scaroles en pépinière jusqu'au 30 juin : plantées de fin juillet à septembre, elles se récolteront à l'automne et en hiver.
- ☐ Récoltez tomates et courgettes le matin, avant 9 h, quand les fruits sont frais : cueillis chauds, ils se conservent mal.
- ☐ Régularisez l'arrosage, tous les 3 à 4 jours, pour éviter la pourriture apicale des tomates, ces taches noires sous le fruit liées à des à-coups d'eau.
- ☐ Posez une soucoupe peu profonde remplie de cailloux et de 2 cm d'eau, renouvelée chaque jour, pour les abeilles et les auxiliaires.