

À surveiller : Mai chaud : 30 °C dès la mi-mai est courant, et le mistral dessèche les feuilles. Un plant jeune non paillé et non arrosé grille en 2 jours ; anticipez ombrage, paillage et arrosage régulier.

Semer sous abri

Scarole et chicorée frisée · 2e moitié
Chou kale · 2e moitié

Semer en place

Concombre
Cornichon
Courge butternut
Courgette
Maïs doux
Melon
Pastèque
Pâtisson
Potimarron
Potiron
Haricot à rames
Haricot vert nain
Betterave · 1re moitié
Panaïs · 1re moitié
Radis · 1re moitié
Rutabaga · 2e moitié
Poireau
Batavia · 1re moitié
Blette
Céleri branche
Roquette · 1re moitié
Brocoli · 2e moitié
Chou de Bruxelles
Chou pommé
Chou-fleur
Aneth
Basilic
Ciboulette
Estragon · 1re moitié
Menthe · 1re moitié
Origan · 1re moitié
Persil
Thym · 1re moitié
Bourrache
Capucine · 1re moitié
Œillet d'Inde · 1re moitié
Tournesol

Planter, repiquer

Aubergine
Concombre
Cornichon
Courge butternut
Courgette
Melon
Pastèque
Pâtisson
Piment
Poivron
Potimarron
Potiron
Tomate · 1re moitié
Tomate cerise · 1re moitié
Céleri-rave
Patate douce
Batavia
Blette · 1re moitié
Céleri branche · 1re moitié
Chou-rave · 1re moitié
Basilic
Ciboulette · 1re moitié
Estragon · 1re moitié
Menthe · 1re moitié
Origan
Persil
Romarin · 1re moitié
Sauge · 1re moitié
Thym · 1re moitié
Bourrache · 1re moitié
Capucine · 1re moitié
Œillet d'Inde
Tournesol · 1re moitié

Récolter

Courgette · 2e moitié
Fève
Pois à écosser
Pois mange-tout
Betterave · 2e moitié
Carotte
Navet
Pomme de terre · 2e moitié
Radis
Ail · 2e moitié
Échalote · 2e moitié
Oignon
Batavia
Blette · 2e moitié
Épinard
Laitue
Roquette
Brocoli · 2e moitié
Chou pommé
Chou-fleur · 2e moitié
Chou-rave
Artichaut
Asperge
Rhubarbe
Aneth
Cerfeuil
Ciboulette
Coriandre
Estragon
Menthe
Origan
Persil
Romarin
Sauge
Thym
Fraisier
Framboisier · 2e moitié
Bourrache
Capucine · 2e moitié
Œillet d'Inde · 2e moitié
Souci

Les gestes de mai

- ☐ Épaississez le paillage à 8 à 10 cm de paille sur les planches de tomates, aubergines et courges avant les premières journées à 30 °C : il garde le sol frais et limite l'évaporation.
- ☐ Arrosez au pied, tôt le matin, les tomates à 10 à 15 L/m² par semaine et les courgettes à 15 à 20 L/m² : deux apports par semaine valent mieux qu'un arrosage quotidien.
- ☐ Tendez dès la mi-mai une toile d'ombrage à 30 % sur arceaux au-dessus des laitues et des épinards, de midi à 17 h : la chaleur les fait monter en graine.
- ☐ Liez les tomates au tuteur à chaque bouquet, tous les 25 à 30 cm de croissance : une tige chargée de fruits casse au vent.
- ☐ Récoltez les fraises tous les 2 jours, le matin, et tendez un filet : les oiseaux les repèrent dès qu'elles rougissent.
- ☐ Vérifiez toutes les 2 semaines les fourmis qui montent sur les tiges : elles élèvent des pucerons ; rincez les colonies au jet d'eau et laissez les coccinelles s'installer.
- ☐ Plantez melons et pastèques à la mi-mai sur butte, et arrosez au pied sans mouiller les feuilles : leurs besoins montent à 15 à 20 L/m² par semaine en juin.
- ☐ Semez le maïs doux en carré de 3 à 4 rangs plutôt qu'en ligne unique : le pollen tombe par le vent, une ligne isolée laisse des épis mal remplis.