

À surveiller : Les journées douces de mars font lever les graines, mais les nuits restent froides jusqu'à mi-avril. Semez par séries décalées de 2 à 3 semaines plutôt qu'en un bloc : une gelée tardive n'abîmera qu'une série, et les récoltes seront étalées.

Semer sous abri

Aubergine	Chou kale · 2e moitié
Melon · 2e moitié	Chou pommé
Piment · 1re moitié	Chou-fleur
Poivron	Chou-rave
Tomate	Artichaut
Tomate cerise · 2e moitié	Cerfeuil
Carotte	Ciboulette
Céleri-rave	Coriandre · 2e moitié
Navet	Estragon
Patate douce	Menthe
Radis	Origan
Oignon	Persil
Poireau	Romarin
Batavia	Sauge
Blette · 2e moitié	Thym
Céleri branche	Bourrache · 2e moitié
Laitue	Capucine · 2e moitié
Roquette	Œillet d'Inde
Brocoli	Souci
Chou de Bruxelles	

Semer en place

Fève	Épinard
Pois à écosser	Laitue · 2e moitié
Pois mange-tout	Roquette · 2e moitié
Panais	Persil · 2e moitié
Oignon · 2e moitié	Souci · 2e moitié
Batavia · 2e moitié	

Planter, repiquer

Pomme de terre · 2e moitié	Asperge · 2e moitié
Topinambour	Rhubarbe
Ail	Cassissier · 1re moitié
Échalote	Fraisier · 2e moitié
Oignon · 2e moitié	Framboisier
Batavia · 2e moitié	Groseillier · 1re moitié
Laitue · 2e moitié	Myrtilier

Récolter

Panais · 1re moitié	Chou de Bruxelles · 1re moitié
Topinambour	Chou kale · 1re moitié
Poireau · 1re moitié	Romarin
Épinard	Sauge
Mâche · 1re moitié	Thym · 2e moitié

Les gestes de mars

- ☐ Semez aubergines et poivrons début mars, puis les tomates à partir du 10 mars, en intérieur à 20 °C : plantées à la mi-mai, elles auront 8 à 11 semaines, ni trop petites, ni étiolées.
- ☐ Chaulez seulement si votre mesure de janvier donne un pH inférieur à 6 : dose de l'étiquette, par temps sec, sur sol non gelé, et attendez 4 semaines avant tout apport de compost ou de fumier.
- ☐ Préparez un faux semis : laissez la planche travaillée 10 à 15 jours, laissez lever les herbes, puis passez le râteau juste avant de semer les carottes, au lieu de désherber plus tard.
- ☐ Semez épinards dès début mars, puis radis et laitues sous voile à la fin du mois : le voile gagne 1 à 3 °C pendant les nuits de mars.
- ☐ Retournez le tas de compost : placez au centre ce qui était sur les bords, humidifiez si le tas est sec ; un compost mûr est brun, friable, sans odeur forte, après 6 à 9 mois.
- ☐ Paillez le pied des framboisiers sur 10 cm de paille, de compost ou de tontes séchées : leurs racines superficielles craignent la sécheresse et ne supportent pas le bêchage profond.
- ☐ Posez dès le jour du semis un filet anti-insectes à maille de 0,8 mm sur radis et navets : les altises arrivent dès les premiers beaux jours et ravagent les jeunes feuilles en quelques jours.
- ☐ Plantez les oignons en bulbilles dès que la terre est ressuyée : 10 cm entre bulbilles, 25 cm entre rangs, pointe visible en surface, pour récolter en juillet-août.