

À surveiller : Novembre amène les premières vraies gelées au sol, souvent avant celles de l'air. Un voile posé sur les cultures d'hiver et un paillage de 5 cm font la différence ; ne piétinez pas les planches gelées.

Semer sous abri

Rien de particulier ce mois-ci.

Semer en place

Rien de particulier ce mois-ci.

Planter, repiquer

Ail	Framboisier
Échalote · 1re moitié	Groseillier
Rhubarbe · 1re moitié	Myrtillier
Cassissier	

Récolter

Carotte	Scarole et chicorée frisée
Céleri-rave · 1re moitié	Brocoli · 1re moitié
Navet	Chou de Bruxelles
Panais	Chou kale
Radis noir	Chou pommé
Rutabaga	Chou-fleur · 1re moitié
Topinambour	Chou-rave · 1re moitié
Poireau	Pak-choï · 1re moitié
Batavia · 1re moitié	Cerfeuil · 1re moitié
Blette · 1re moitié	Persil
Céleri branche · 1re moitié	Romarin
Épinard	Sauge
Laitue · 1re moitié	Thym
Mâche	

Les gestes de novembre

- ☐ Posez un voile d'hivernage sur la mâche et les épinards dès que la minimale annoncée passe sous 0 °C : il protège sans les étouffer, et les feuilles restent propres pour la récolte.
- ☐ Plantez framboisiers remontants (cueillette de la mi-août à novembre) et non remontants (juin-juillet) à racines nues, sol non gelé : 0,50 m entre pieds, puis paillez de 10 cm.
- ☐ Vidangez la cuve, les tuyaux et les robinets extérieurs avant le 1er décembre : l'eau gelée fait éclater les canalisations.
- ☐ Cueillez épinards et blettes en coupant les feuilles extérieures à 3 cm de la souche : le cœur continue de produire jusqu'aux gelées fortes.
- ☐ Couvrez le sol nu de 5 cm de feuilles broyées : il protège des pluies battantes et des gelées, et nourrit la vie du sol.
- ☐ Couvrez le tas de compost d'une bâche ou d'un carton pour 4 mois, de novembre à mars : l'eau de l'hiver lessive les éléments nutritifs et refroidit le tas.
- ☐ Laissez les carottes en terre sous 10 cm de paille : elles résistent à -5 °C et se récoltent à la demande jusqu'en janvier.
- ☐ Notez dans votre carnet la date de la première gelée, à côté de celle de la dernière au printemps (vers le 15 avril en moyenne) : l'écart donne la durée réelle de la saison de culture de votre jardin.